

**GINKOFAR FORTE
60 TABL.**



Skład: jedna tabletkę zawiera 80 mg suchego ekstraktu z liści miorzębu japońskiego Ginkgo biloba L.
Wskazania: zaburzenia krążenia mózgowego z następującymi objawami: utrudniona koncentracja myślowa, zaburzenia pamięci, zawroty i bóle głowy, szumy w uszach, osłabienie słuchu i wzroku, krążenia obwodowego, kłótność towarzysząca zaburzeniom w skróceniu kończyn dolnych – uczucie zimna i bólu w stopach.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki leku. Zła tolerancja leku. Lek zawiera laktozę i z tego względu nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem Laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o.

**BIOVITAL PAMIĘĆ
650 ml**



Suplement diety. Kompozycja składników stworzona specjalnie by wspierać pamięć i koncentrację oraz wspomagać funkcje układu nerwowego.

**OLIMP ŻEŃ-SZEŃ VITA-COMPLEX
30 KAPS.**



Suplement diety. Kompozycja najwyższej jakości standaryzowanych ekstraktów z dwóch gatunków żeń-szenia, wzbogacona dodatkowo ekstraktem pieprzu czarnego i kompleksem 12 witamin. Ekstrakt żeń-szenia, bogaty w ginsenosydy, uczestniczy w utrzymaniu vitalności i należytej sprawności fizycznej organizmu.

**BIOVITAL ZDROWIE
1000 ml**



Suplement diety. Kompozycja witamin i minerałów w odpowiednio dobranych dawkach oraz wyciąg z glogu, wpływająca korzystnie na pracę serca, podnosząca vitalność i poprawiająca samopoczucie.

**OLIMP GOLD LECYTyna 1200
60 KAPS.**



Suplement diety w postaci miękkich kapsulek „softgel” zawiera naturalną lecytynę sojową będącą źródłem niezwykle ważnych składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowej pracy serca, układu krążenia i systemu nerwowego.

**FALVIT
60 TABL. DRAŻ**



Suplement diety. Zestaw witamin i minerałów, opracowany specjalnie dla kobiet.

**OLIMP VITA-MIN PLUS
OLIMP VITA-MIN PLUS DLA KOBIET
OLIMP VITA-MIN PLUS SENIOR
OLIMP VITA-MIN PLUS MAMA
30 KAPS.**



Suplement diety. Kompleksowa kompozycja witamin i łatwo przyswajalnych składników mineralnych w postaci chelatów, ułatwiająca pokrycie zapotrzebowania organizmu na niezbędne mikrośladki pokarmowe.

* Oferta obowiązuje w okresie od 16 maja 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. lub do wyczerpania zapasów. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Wydawca: Doradztwo Paśniewski i Wspólnicy Spółka Jawna Dąbrówki 30/7, 16-010 Wasilków. Na zlecenie firm farmaceutycznych.

**DIOSMINEX
60 TABL.**



Skład: 500mg diosminu, substancje pomocnicze. **Wskazania:** w leczeniu objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego: uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze łydek, w leczeniu objawowym w przypadku zaostżenia dolegliwości związanych z żyłkami odbytu. **Przeciwwskazania:** jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diosmin lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. **Podmiot odpowiedzialny:** Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

**AFLAVIC 600mg
30 TABL. POWŁ.**



- **Bóle i uczucie ciężkości nóg**
- **Leczenie objawów związanych z hemoroidami**

Skład: 600mg diosminy, substancje pomocnicze. **Wskazania:** Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych m.in. uczucie ciężkości nóg, bóle nóg. Leczenie objawowe w przypadku zaostżenia objawów dolegliwości związanych z żyłkami odbytu. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na diosmin lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. **Podmiot odpowiedzialny:** Polfarmex S.A.

**ZUMA ŚWIETLIK PLUS
KROPLE DO OCZU 10ml**



Skład: wyciąg ze świetlika 10%, wyciąg z rumianku 10%, wyciąg z bławatki 10%, wyciąg z oczaru wirgińskiego, fosforan dwusodu. **Wskazania:** krople do oczu, które dzięki odświeżającym, kojącym i uspakajającym właściwościom świetlika, rumianku, bławatki i oczaru łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia oczu spowodowane zbyt długą pracą przy komputerze, wysiłkiem sportowym, działaniem czynników zewnętrznych, takich jak: wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym, kurz, zwiększone nasłonecznienie. **Przeciwwskazania:** nie używać, jeśli opalowanie jest uszkodzone, nie stosować w przypadku uczulenia na składniki preparatu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu, nie stosować po upływie terminu ważności wyodrębkowanym na opakowaniu, zdejść soczewki kontaktowe przed użyciem. **Podmiot odpowiedzialny:** S-LAB SP. Z O. O.

**ARTRESAN
90 KAPS.**



Suplement diety, który uzupełnia codzienną dietę w glukozaminę, która odżywia stawy, stymuluje fizjologiczne procesy związane z funkcjonowaniem stawów, tj. regenerację komórek chrząstki stawowej, syntezę kolagenu chrząstki stawowej oraz wchodzi w skład płynu maziowego – substancji poślizgowej w stawach.

**DOPPELHERZ AKTIV
NA OCZY
30 KAPS.**



Suplement diety. Kompleksowa ochrona oczu, chroni siatkówkę i soczewkę oczu przed zmianami degeneracyjnymi i promieniowaniem UV, łagodzi zmęczenie oczu spowodowane długotrwałą koncentracją wzroku, usprawnia proces widzenia.

**PERMEN KING
30 TABL.**



Suplement diety. Ulepszona kombinacja skutecznych substancji wzmagających pożądanie i poprawiających sprawność seksualną.

**BIOLUTEINA
30 TABL.**



Suplement diety. Naturalne wspomaganie prawidłowej ostrości widzenia i ulga dla zmęczonych oczu.

* Oferta obowiązuje w okresie od 16 maja 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. lub do wyczerpania zapasów. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Wydawca: Doradztwo Pańiewski i Wspólnicy Spółka Jawna Dąbrówki 30/7, 16-010 Wasilków. Na zlecenie firm farmaceutycznych.

**VITA D
DLA NIEMOWŁĄT
30 KAPS.**



Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. **Skład:** 1 otwierana kapsułka „twist-off” zawiera 10 mikrogramów (400 j.m.) witaminy D. **Wskazania:** Do postępowania dietetycznego w profilaktyce niedoboru witaminy D.
Dystrybutor: Vitis Pharma Sp. z o.o.

**MARSJANKI BOBASKI
Z INULINĄ
100 SASZ.**



Suplement diety, którego składniki wpływają na prawidłowy stan zdrowia i ogólną vitalność u dzieci, dodatkowo wzbogacone w prebiotyki (inulina, tzn. rodzaj rozpuszczalnego błonnika), który stanowi niezbędną pożywkę dla bakterii znajdujących się w układzie trawiennym i wspiera ich wzrost, a także pozytywnie wpływa na pracę układu pokarmowego oraz prawidłowe przyswajanie wapnia.

**IBUM ZAWIESINA MALINOWY 100mg/5ml
130g**



Skład: 5 ml zawiesiny zawiera ibuprofenu 100 mg. **Wskazania:** Stany gorączkowe różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych, a także w przebiegu odzysku poszczeniennego. Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak: bóle głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych), bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek zgłokowania, bóle stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia), bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na ibuprofen lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego, nie stosować u osób, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), występowały w przeszłości jakiegokolwiek objawy alergii w postaci kałanu, pokrzywki lub ostrej oskrzelowej choroby wrzodowa żołądka (lub) dwunastnicy czyma lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ, ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca, nie stosować ibuprofenu jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2, III trymestru ciąży, skaza krwotoczna.
Podmiot odpowiedzialny: PPF Hisco-Lek S.A.

**MARSJANKI SYROP
300ml**



Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Składniki zawarte w preparacie Marsjanki Syrop są istotne dla wzrostu i rozwoju fizjologicznego dziecka, to m.in. kompleks Immunactiv* składający się z czterech substancji aktywnych, tj. beta glikanu, bioflawonoidów, witaminy C i cynku, który wpływa na właściwe funkcjonowanie systemu odpornościowego.

**STERIMAR BABY SPRAY DO NOSA
50ml**



Skład: Izotoniczny roztwór wody morskiej. Produkt naturalny, bogaty w pierwiastki śladowe i mikroelementy, bez konserwantów. **Wskazania:** nawilżanie – zapobiega wysuszeniu śluzówki, zwłaszcza w sezonie grzewczym, w klimatyzowanych pomieszczeniach, higieny nosa – oczyszcza nos, ułatwia oddychanie oraz karmienie, infekcje – pozwala usunąć śluz, ułatwia oddychanie w czasie infekcji. Sterimar Baby jest szczególnie zalecany do higieny nosa niemowląt i małych dzieci.
Podmiot odpowiedzialny: Merck sp. z o.o.

**ACIDOLAC BABY
10 SASZ.**



Suplement diety w postaci opracowanej specjalnie dla niemowląt i małych dzieci. Przywraca prawidłową florę bakteryjną i reguluje czynności przewodu pokarmowego małych dzieci, zwłaszcza w trakcie i po antybiotykoterapii, a także wspomaga odporność organizmu.

* Oferta obowiązuje w okresie od 16 maja 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. lub do wyczerpania zapasów. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Wydawca: Doradztwo Paśniewski i Wspólnicy Spółka Jawna Dąbrówki 30/7, 16-010 Wasilków. Na zlecenie firm farmaceutycznych.

**AVIOMARIN
5 TABL.**



Skład: 50mg dimenhydraminy, substancje pomocnicze. **Wskazania:** zapobieganie chorobie lokomocyjnej oraz zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów innego pochodzenia (z wyjątkiem wywołanych przez leki stosowane w chemioterapii nowotworów). **Przeciwwskazania:** uczulenie (nadwrażliwość) na składniki leku lub inne leki przeciwhistaminowe, jeśli u pacjenta występuje: ostry napad astmy, jaskra z wąskim kątem przesłania, guz chromochłomy, porfina, przerost gruczołu krokowego oraz zaleganie moczu w pęcherzu, padaczka, dzieci poniżej 6-go roku życia.

Podmiot odpowiedzialny: TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

**STOPERAN
8 KAPS.**



Skład: 2mg Loperamidi hydrochloridum. **Wskazania:** w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stany, w których niepożądane jest spowolnienie perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia okrężnicy powiększonej, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie preparatem Stoperan należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Ostre wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostry raz krwotoczny zapalenie jelita grubego, rakomoboniaste zapalenie jelit, zwłaszcza związane z podwładaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Ostro czerwona z krwią w kale i przebiegająca z podwyższoną temperaturą ciała. Bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter. Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat.

Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

**LAMISILATT 1% KREM
15g**



Skład: 1g żelu zawiera 10mg chlorowodoru terbinafiny, substancje pomocnicze. **Wskazania:** w miejscowym leczeniu: grzybicy stóp, grzybicy fałdów skórnych, grzybicy skóry gładkiej, łupieżu pstrego. **Przeciwwskazania:** uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek terbinafiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health

**ALTACET ŻEL
75g**



Skład: 1g żelu zawiera 10 mg octanowianu glinu. **Wskazania:** do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych pourazowych i spowodowanych oparzeniami pierwszego stopnia. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na octanowian glinu lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. **Nie stosować:** doustnie, długotrwale, na rozległe rany, uszkodzoną lub zakazaną skórę. Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Podmiot odpowiedzialny: Emo-Farm Sp. z o.o.

**FENISTIL ŻEL
30g**



Skład: 1g żelu zawiera 1mg maleianu dimetindenu. **Wskazania:** swędzący towarzyszący chorobom skóry, pokrzywce, ukąszenia owadów, oparzeniem słonecznym, powierzchniowym oparzeniem skóry. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na składniki leku, oparzenie III i III stopnia.

Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health

**MAXIBIOTIC MAŚĆ
5g**



Skład: 1 g maści zawiera: 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas), 5000 j.m. polimiksymy B siarczanu (Polymyxini B sulfas) oraz 400 j.m. bacytracyny cynkowej (Bactracinum zincum). **Substancja pomocnicza:** wazelina biała. **Wskazania:** drobne rany (otarcia, zadrapania, ukąszenia), oparzenia, owrożdżenia skóry. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancje czynne, tj. neomycyny siarczan, polimiksymy B siarczan, bacytracynę cynkową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, zaburzenia słuchu, do oczu, na głębokie lub duże rany, ciężkie oparzenia, duże powierzchnie uszkodzonej skóry oraz na sączące zmiany chorobowe, ze względu na ryzyko wchłonięcia substancji czynnych do krążenia ogólnego i wywoływania ogólnoustrojowych działań niepożądanych (ototoksyczność, nefrotoksyczność), u dzieci w wieku do 12 lat.

Podmiot odpowiedzialny: EMO-FARM Sp. z o.o.

**ZESTAW PŁASTRÓW
UNIERSALNE/TURYSTYCZNE
24 szt.**



Zestaw plasterów z opatrunkiem do opatrywania drobnych ran i skaleczeń.

**NAILPEN SZTYFT 4ml
+ AKCESORIA**



Produkt jest dostarczany z 5 pilniczkami do paznokci i łatywem w użyciu, niechlapiącym sztyftem oraz wymiennymi końcówkami sztyftu, aby zapobiec ponownemu zakażeniu. **Skład:** Glikol pentylenowy, izosorbid dimetylu, Olive Leaf Active, fibroina jedwabna, hydrolizowana, 2-fenoksyetanol, woda. **Wskazania:** Grzybica paznokci. **Wytwórca:** MEDICAL BRANDS HOLLANDIA. **Dystrybutor:** Biorena Pharma Sp. z o.o.

* Oferta obowiązuje w okresie od 16 maja 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. lub do wyczerpania zapasów. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Wydawca: Doradztwo Pańiewski i Wspólnicy Spółka Jawna Dąbrowski 30/7, 16-010 Wasilków. Na zlecenie firm farmaceutycznych.

**RAPAB
30 KAPS.**



Suplement diety, którego składniki łagodzą niestrawność, wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia.

**ESSENTIALE FORTE
50 KAPS.**



Skład: 300mg phospholipidum essentiale, substancje pomocnicze. **Wskazania:** zmniejsza subiektywne dolegliwości pacjenta takiej jak: brak apetytu, wrażliwość ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działaniem substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Ze względu na zawartość oleju sojowego produkt może powodować ciężkie reakcje alergiczne. **Podmiot odpowiedzialny:** Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

**MORWA BIAŁA
30 TABL.**



Suplement diety pomagający w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi oraz uzupełnienie diety podczas odchudzania.

**POLPRAZOL ACIDCONTROL
14 KAPS. TWARDE**



Skład: 10mg omeprazolium, substancje pomocnicze. **Wskazania:** Objawy cofania treści żołądkowej do przełyku (refluks żołądkowo-przełykowy); Objawowe leczenie dolegliwości pieczenia w przełyku (zgaga). **Przeciwwskazania:** u pacjentów z nadwrażliwością na omeprazol lub którykolwiek substancje pomocnicze, u pacjentów przyjmujących atazanawir, ze względu na ryzyko znacznego zmniejszenia stężenia atazanawiru. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

**DOPPELHERZ AKTIV
NA POZIOM CUKRU
30 KAPS.**



Suplement diety zalecany dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów (cukrzyca). Zawiera wytyczak z kory cynamonowca zalecany do stosowania w ramach diety cukrzycowej.

**STEROLEA
30 TABL.**



Suplement diety, który wraz ze zbilansowaną dietą pomaga dbać o prawidłowy poziom cholesterolu, korzystnie wpływa na poziom „dobrego” cholesterolu HDL.

* Oferta obowiązuje w okresie od 16 maja 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. lub do wyczerpania zapasów. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Wydawca: Doradztwo Paśniewski i Wspólnicy Spółka Jawna Dąbrówki 30/7, 16-010 Wasilków. Na zlecenie firm farmaceutycznych.

**MAGNESIUM B6 POLFA-ŁÓDŹ
60 TABL.**



Suplement diety, który jest połączeniem magnezu w postaci dobrze przyswajalnego miedzanu magnezu oraz witaminy B6.

**DOPPELHERZ AKTIV
MAGNEZ B6 FORTE 400mg
30 TABL.**



Suplement diety, może być stosowany w okresie intensywnej pracy umysłowej i stresu, w stanach wyczerpania oraz dla wspomagania pracy mięśni. Magnez i witamina B6 + B1: zwiększają odporność na stres, wspomagają pracę układu nerwowego, regulują kurczliwość mięśni.

**ASPARAGINIAN
100 TABL.**



Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych w celu wspierania należytego działania układu krążenia i właściwej pracy serca, ma wpływ na regulację ciśnienia tętniczego oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu nerwowego.

**ACARD
30 TABL. DOJELITOWYCH**



Skład: 75mg kwasu acetylosalicylowego. **Wskazania:** Lek przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych, w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka w świeżym zawałowi serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca; w niestabilnej chorobie wieńcowej; w zapobieganiu powtórному zawałowi serca, po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczęciu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyczne naczyniowe; w zapobieganiu napadom przebiegowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego, udaru mózgu oraz po ich przebiegu; u osób z zrostową miażdżycą tętnic obwodowych; w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka; w zapobieganiu zakrzepicy żyłnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwałe unieruchomionych. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek składnik leku; zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; ciężka niewydolność nerek; wady serca; napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych; trzy ostatnie miesiące ciąży; jeśli pacjent stosuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15mg na tydzień lub większych; u dzieci do 12 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna), z uwagi na możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye'a). **Podmiot odpowiedzialny:** Warszawski Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

**MELATONINA LEK-AM 5mg
30 TABL.**



Skład: 5mg melatoniny, substancje pomocnicze. **Wskazania:** w zaburzeniach snu związanych z zaburzeniami rytmu snu i czuwania, np. w zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych, lub w związku z pracą zmianową, zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u pacjentów niewidomych. **Przeciwwskazania:** uczulenie na melatoninę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Melatonina LEK-AM, po spożyciu alkoholu, w okresie ciąży lub laktacji. **Podmiot odpowiedzialny:** Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

**LACIDAR
20 TABL.**



Suplement diety. Symbiotyk połączenie certyfikowanych bakterii probiotycznych i imunitny - prebiotyk. Łagodzi niekorzystny wpływ antybiotyków na przewód pokarmowy.

**METAFEN
10 TABL.**



Skład: 200 mg ibuprofenu + 325 mg paracetamolu, substancje pomocnicze. **Wskazania:** bóle różnego pochodzenia, w tym: bóle głowy, migrena, bóle menstruacyjne, bóle zębów, bóle mięśni, bóle kości i stawów, bóle łędwiowo-krzyżowe, bóle pourazowe, nerwobóle. Gorączka w przebiegu przebiegnięcia, zakażeń wirusowych i innych chorób. **Przeciwwskazania:** uczulenie na paracetamol, ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku, uczulenie na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry i błon śluzowych, charakteryzujące się występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli, niezłytu nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ, ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czymkolwiek) lub w wywiadzie; perforacji lub krwawień, również tych występujących po zastosowaniu leków z grupy NLPZ, ciężkie nadciśnienie tętnicze, ciężka choroba układu sercowo-naczyniowego, tachykardia (przyspieszonej akcji serca), dławicy piersiowej, ciężka niewydolność serca, ciąża i karmienie piersią, jednoczesne przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych oraz w składe krwotocznej (skłonności do krwawień w obrębie np. skóry i błon śluzowych, nosa, układu pokarmowego), zatrzymanie moczu, jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2, u pacjentów u których występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6 fosforanowej, u dzieci w wieku poniżej 12 lat, choroba alkoholowa. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

**IBUM FORTE
12 KAPS.**



Skład: Ibuprofenu 400 mg, subst. pomocnicze. **Wskazania:** Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (w tym także migreny), bóle zębów, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle po urazach, nerwobóle, bóle towarzyszące przebiegnięciu i grypie, bolesne miesiączkowanie, stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na ibuprofen lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ, ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca, nie stosować u osób, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) występowały w przeszłości jakiegokolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej. III trymestr ciąży, nie stosować ibuprofenu jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych), skaza krwotoczna. **Podmiot odpowiedzialny:** PPF Hasco - Lek S.A.

* Oferta obowiązuje w okresie od 16 maja 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. lub do wyczerpania zapasów. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wydawca: Doradztwo Pańiewski i Wspólnicy Spółka Jawna Dąbrówki 30/7, 16-010 Wasilków. Na zlecenie firm farmaceutycznych.

**BŁONNIK Z ANANASEM
100 TABL.**



Suplement diety zalecany dla osób z nadwagą, prowadzących siedzący tryb życia, o małej aktywności ruchowej. Wskazany dla osób odchudzających się z tendencjami do zaparc.

**DIETA LIGHT
PRZEKĄSKA KARMELOWA
BATON W MLECZNEJ
CZEKOLADZIE
1 szt.**



Środek spożywczy zastępującym posiłek do kontroli masy ciała i należy do grupy produktów LCD (Low Calorie Diet) – dieta niskokaloryczna. Jest produktem stosowanym w zastępstwie posiłku do kontroli głodu. Jest bogaty w białko i błonnik, dzięki czemu daje uczucie sytości na długo. Zawiera również cenne dla organizmu witaminy i minerały.

**ASYSTOR SLIM
30 TABL. NA RANO
30 TABL. NA WIECZÓR**



Suplement diety, system odchudzania dwufazowego na rano i wieczór, który dostarcza właściwych składników odchudzających dokładnie wtedy gdy są potrzebne. Faza 1: składniki tabletki na rano przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej i ograniczają wchłanianie węglowodanów. Faza 2: składniki tabletki na wieczór ograniczają apetyt i zwiększają metabolizm w nocy.

**NATURKAPS BETA KAROTEN
90 KAPS.**



Suplement diety. Produkt zaleca się stosować jako uzupełnienie diety w beta-karoten w okresie jesienno-wiosennym oraz w warunkach zwiększonej ekspozycji na światło słoneczne.

**OLIMP CLA Z ZIELONĄ HERBATĄ
PLUS L-KARNITYNA
60 KAPS.**



Suplement diety dostarcza trzy najbardziej aktywne substancje wspomagające proces redukcji tkanki tłuszczowej: CLA, wyciąg zielonej herbaty mianowany na EGCG oraz L-karnitynę. Specjalnie dobrany zestaw składników uaktywnia wszystkie etapy spalania tłuszczu, zapobiegając jednocześnie utracie jedności ciała.

**MENOSTOP
60 KAPS.**



Suplement diety zalecany jest jako uzupełnienie diety w izoflawony sojowe kobietom w okresie menopauzy.

**PROVAG 10 KAPS.
PROVAG ŻEL 30g**



proVag x 10kaps. - suplement diety, pomaga przywrócić właściwą fizjologiczną florę układu moczowo-płciowego oraz utrzymuje właściwe pH pochwy, które hamuje wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych.
proVag żel 30g - innowacyjny żel do łagodzenia podrażnień, ochrony, nawilżania i pielęgnacji miejsc intymnych.

**FEMIBION NATAL 2
30 TABL. + 30 KAPS.**



Suplement diety uzupełniający dietę kobiety w okresie od 13. tygodnia ciąży do końca karmienia piersią składniki odżywcze.

* Oferta obowiązuje w okresie od 16 maja 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. lub do wyczerpania zapasów. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Wydawca: Doradztwo Paśniewski i Wspólnicy Spółka Jawna Dąbrówki 30/7, 16-010 Wasilków. Na zlecenie firm farmaceutycznych.

**CALCIUM ALEGRO PLUS
16 TABL. MUS.**



Suplement diety jest połączeniem trzech składników: wapnia, kwercetyny oraz cynku.

**ALLEGRA
10 TABL. POWL.**



Skład: 120mg chlorowodoru fexofenadyny, substancje pomocnicze. **Wskazania:** w leczeniu objawów kataru siennego (sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa), takich jak: kichanie, swędzenie nosa, katar lub uczucie zatkanego nosa oraz swędzenie, zaczerwienienie i łzawienie oczu. **Przeciwwskazania:** uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek fexofenadyny lub inne składniki leku. **Podmiot odpowiedzialny:** Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

**ZYRTEC UCB
7 TABL.**




Skład: 10mg Cetirizyni dihydrochloridum, substancje pomocnicze. **Wskazania:** łagodzenie objawów dotyczących oczu i uszu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny, ciężka niewydolność nerek. **Podmiot odpowiedzialny:** Vedim Sp. z o.o.

**PNEUMOLAN SYROP
120 ml**



Suplement diety, zawiera optymalną kompozycję ekstraktów roślinnych, które wykazują korzystne, wzajemnie uzupełniające się oddziaływanie na funkcje układu oddechowego oraz zatoki.

**VITAMARIN
120 KAPS.**



Suplement diety zawierający w swym składzie olej z wątroby rekina grenlandzkiego, który: wzmacnia odporność, wspomaga regenerację organizmu, spowalnia procesy starzenia.

**ASCALCIN PLUS CYTRYNA, GREJPFRUT
10 SASZ.**



Skład: Jedna saszetka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 300 mg kwasu askorbowego, 200 mg jonów wapnia (w postaci laktogluonianu wapnia). **Wskazania:** gorączka i dolegliwości bólowe związane z przeziębieniem i gripą; bóle o lekkim i średnim nasileniu (bólę zębów, nerwobóle, bóle stawów i mięśni, bóle głowy, migrena); choroby reumatyczne. **Przeciwwskazania:** uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub inne składniki preparatu, czynna choroba wrzodowej jelitka, dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego, astma oskrzelowa, skazy krwotocznej pacjenta, problemach z krzepnięciem krwi lub przy stosowaniu leków przeciwzakrzepowych, zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej organizmu (cukrzyca, mocznica, tężyczka), zwiększonego stężenia wapnia we krwi, ciężkiej niewydolności nerek, wątroby, serca, ostatni trymestr ciąży, fenyloketonuria, dzieci poniżej 12-go roku życia, nie podawać jednocześnie z metoteksematem. **Podmiot odpowiedzialny:** Polfa-Łódź SA

* Oferta obowiązuje w okresie od 16 maja 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. lub do wyczerpania zapasów. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Wydawca: Doradztwo Pańiewski i Wspólnicy Spółka Jawna Dąbrówki 30/7, 16-010 Wasilków. Na zlecenie firm farmaceutycznych.